

RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED VACCINATION ENKELT- OG PARVIS OPSTALDNING

STALDFORHOLD, ENKELTHYTTER/BOKSE

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
Underlaget: tørhed v. knætest	0	5 af 5
	10	4 af 5
	20	< 4
Redeeffekt	0	Ikke synlige
	10	Delvis synlige
	20	Helt synlige
Kontakt	0	1
	10	2
	20	Flere
Sektionering	0	Nej
	20	Ja
Rengørings-frekvens	0	Efter hver kalv
	10	Oftest efter hver kalv
	25	Sjældent eller aldrig efter hver kalv
Type af rengøring	0	sæbe og desinfektion
	10	vand og/eller desinfektion
	20	Intet
Højtryksrensning	0	Ja
	20	Nej
Træk	0	Nej
	20	Ja
Støv	0	Intet
	10	Forekommer
	20	Meget
Luftskifte	0	tilstrækkelig
	10	utilstrækkelig

VACCINATION

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
Opbevaring	0	2-8 grader (log eller alarm)
	5	2-8 grader (uden log eller alarm)
	30	< 2 eller > 8 grader
Brug	0	Ja
	20	Nej
Håndtering	0	Efter hver kalv
	10	Efter maksimalt 10 kalve
	20	Sjældnere

DYRET, ENKELTHYTTER/BOKSE

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
IgG-niveau	0	≥ 90 %
	30	< 90 %
Hygiejne-score	0	≤ 10 %
	10	11-40%
Konstitution	20	> 40%
	0	blankt
	10	mat
Tåreflåd/næseflåd	20	mat samt ektoparasitære tegn
	0	Ingen
	10	≤ 20 %
Stress	20	> 20 %
	0	Nej
	30	Ja

MANAGEMENT, ENKELTHYTTER/BOKSE

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
Hygiejne, vand	0	rene
	10	med biofilm (slimede/fedtede)
	20	beskidte
Tilgængelighed, vand	0	hele tiden
	10	≥ 20 timer i døgnet
	20	< 20 timer i døgnet
	30	sjældent
Tildeling, vand	0	< 30 min. efter mælkefodring
	20	≥ 30 min. efter mælkefodring
Hygiejne Udstyr/mælketaxa	0	rent
	10	med biofilm (slimede/fedtet)
	20	beskidt
Energi, protein og fedt	0	> 800 g/dg
	10	> 600-800 g/dg
	20	> 400-600 g/dg
	30	< 400 g/dg
Udfodrings-temperatur	0	40-42 grader
	10	> 42 grader
	10	< 40 grader
Pasteurise-ring	0	Ja, og korrekt temperatur
	10	Nej
	10	Ja, men forkert temperatur



Kryds score af for de enkelte risikofaktorer, og vurder risikofaktorer med hhv. score 10 eller derover

RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED VACCINATION FÆLLESOPSTALDNING

STALDFORHOLD, FÆLLESOPSTALDNING

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
Underlaget: tørhed	0	> 3 af 5
	10	4 af 5
	20	< 3 af 5
Redeeffekt	0	Ikke synlige
	10	Delvis synlige
	20	Helt synlige
Belægningsgrad	0	Ja
	20	Nej
Gruppetørrelse	0	< 6
	10	
	20	> 10
Sektionering	0	Ja
	20	Nej
	30	Ja
Rengøringsfrekvens	0	Efter hvert hold
	10	Oftest efter hvert hold
	20	Sjældent eller aldrig efter hvert hold
Vask med højtryksrensere	0	... sæbe og desinfektion
	10	... vand og/eller desinfektion
	20	Intet
	0	Ja
Træk	0	Nej
	20	Ja
Støv	0	Intet
	10	Forekommer
	20	Meget
Luftskifte	0	tilstrækkelig
	10	utilstrækkelig

VACCINATION

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
Opbevaring	0	2-8 grader (log eller alarm)
	5	2-8 grader (uden log eller alarm)
	30	< 2 eller > 8 grader
Brug	0	Ja
	20	Nej
Håndtering	0	Efter hver kalv
	10	Efter maksimalt 10 kalve
	20	Sjældnere

DYRET, FÆLLESOPSTALDNING

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
IgG-niveau	0	≥ 90 %
	30	< 90 %
Hygiejne-score	0	≤ 10 %
	10	11-40%
	20	> 40%
Konstitution	0	blankt
	10	mat
	20	mat samt ektoparasitære tegn
Tåreflåd/næseflåd	0	Ingen
	10	≤ 20 %
	20	> 20 %
Stress	0	Nej
	30	Ja

MANAGEMENT, FÆLLESOPSTALDNING

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
Hygiejne, vand	0	rene
	10	med biofilm (slimede/fedtede)
	20	beskidte
Tildeling, vand	10	< 30 min. efter mælkefodring
	20	≥ 30 min. efter mælkefodring
Tilgængelighed, vand	0	Hele tiden og alle kalve kan drikke samtidig
	10	Hele tiden > 10 % af kalvene kan drikke samtidig
	20	Hele tiden < 10 % af kalvene kan drikke samtidig
	30	Vand ikke tilgængeligt hele tiden
Hygiejne Udstyr/mælketaxa	0	rent
	10	med biofilm
	20	beskidt
Energi, protein og fedt	0	> 800 g/dg
	10	> 600-800 g/dg
	20	> 400-600 g/dg
	30	< 400 g/dg
Udfodrings-temperatur	0	40-42 grader
	10	> 42 grader
	10	< 40 grader
Pasteurisering	0	Ja, og korrekt temperatur
	10	Nej
	10	Ja, men forkert temperatur
Tilgængelighed, mælk	10	Ja
	20	Nej




Kryds score af for de enkelte risikofaktorer, og vurder risikofaktorer med hhv. score 10 eller derover

RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED VACCINATION SLAGTEKALVE

TILLÆGSTJEKLISTE, SLAGTEKALVE

RISIKOFAKTOR	SCORE	KRITERIE
Antal leverandører	0	1 besætning
	10	2-5 besætninger
	30	6-10 besætninger
	50	> 10 besætninger
Opstaldning af indkøbte dyr	0	aldrig
	5	sjældent
	10	oftest
	20	altid
Kendskab til leverandør	0	Ja
	20	Nej
Der bruges kalvetjek	0	Ja
	30	Nej
Levering af kalve	0	Nej
	30	Ja
	0	Nej
Kalvens størrelse	10	Ja
	20	Nej

 Kryds score af for de enkelte risikofaktorer, og vurder risikofaktorer med hhv. score 10 eller derover

IMMUNITETSOPTIMERING

TIP
Brug forskellige farver for de forskellige stressfaktorer/managementskift


VACCINATION TIDSLINJE

Marker stressfaktorer/managementskift med henblik på at finde de bedste mulige tidspunkter for vaccination

KALVENS ALDER I UGER	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Indkøb																						
Flytninger/sammenblandinger																						
Mælkefravænning																						
Foderskift (mælk, kraftfoder eller grovfoder)																						
Afhorning																						
Sygdom*																						
Andet																						
Stressfaktorer**																						

* ved forekomst af sygdom (diarre og luftvejslidelser) indsættes start til slutperiode.

**Indsæt antal stressperioder pr. uge i rækken



PRIORITEREDE INDSATSOMRÅDER

INDSATSOMRÅDE	HANDLING	ANSVARLIG	DEADLINE
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

HUSK!

- Følg dyrlægens anvisninger
- Vaccinér kun raske dyr
- Vaccinér min. 1 uge fra stressfaktor/hændelse