

Vacciner til kvæg – opbevaring og anvendelse

Mange vacciner tåler ikke udsving i temperatur eller lyspåvirkning, så vær opmærksom på nedenstående:

Transport af vaccinen

1. De fleste vacciner skal opbevares på køl ved 2-8°C, men tjek altid opbevaringstemperatur f.eks. i produktresuméet, indlægssedlen eller på pakningen for den/de vacciner du anvender
2. Transport – er der dokumenterede, kontrollerede temperaturforhold under transport?

Modtagelse af vaccinen i besætningen

Aftal med leverandør/transportør hvor og hvordan vaccinen afleveres:

1. Hvordan er vaccinen emballeret (flamingokasse, køleelement, etc.)?
2. Hvor afsættes vaccinen (i malkerummets køleskab, i maskinhus eller lade, etc.)?
3. Giver transportør besked ved afsætning med telefonopkald eller sms, og er det til et nummer, der altid er aktivt?

Opbevaring af vaccinen i besætningen

1. Pak vaccinen ud af forsendelsesemballagen straks ved levering og sæt den i køleskab
2. Kontroller jævnligt – f.eks. mindst en gang om ugen – temperaturen i køleskabet vha. et min-maks. termometer
3. Placer ikke vaccinen direkte op af kølelegemet, da det kan medføre frostskaade af vaccinen
4. Placer ikke vaccinen i køleskabslågen, da temperaturen her kan være for høj
5. Beskyt vaccinen mod lys – nogle vacciner er følsomme for lys og opbevares bedst i originalemballagen (papæsken) indtil anvendelsen

Anvend vaccinen korrekt

1. Forbered vaccinen, hvis vaccinen kræver det - nogle vacciner kræver, at tørstof og solvens blandes inden brug, temperér eventuelt solvens inden blanding
2. Det kan være en fordel at blande al nødvendig vaccine til en start
3. Tjek holdbarhed efter opblanding
4. Tjek holdbarhed efter anbrud og anvend al vaccinen indenfor det angivne tidsrum – opbevaring på køl efter anbrud forlænger ikke holdbarheden
5. Temperér vaccinen før brug (til stuetemperatur; hvis det er koldt, så put vaccinen i lommen)
6. Opbland vaccinen grundigt før brug ved at vende flasken forsigtigt gentagne gange UDEN at der dannes skum
7. Anvend rene og korrekt dimensionerede sprøjter og kanyler
8. Følg brugsvejledningen for automatsprøjten, hvis en sådan anvendes
9. Hvem vaccinerer – er vedkommende lært grundigt op?
10. Dosis og administrationsvej, tjek dosis og hvor vaccinen skal indgives på beholderen
11. Skift kanyle ofte

Rengøring af udstyr

1. Automatsprøjter skal rengøres grundigt efter brug – følg anvisninger for sprøjten (Generelt: Skilles ad, vaskes i lunkent vand med sæbe, skylles grundigt så alle sæberester er skyllet af, koges i 20 minutter, lufttørres og gummidele smøres evt. med syrefri olie, samles)
2. Næseskiver til intranasal administration kan koges og genanvendes